

HER
1390

Identification

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| <i>Genre</i> Clostridium | <i>Espèce</i> perfringens | <i>Sous-espèce</i> | <i>Biovar</i> | <i>Sérovar</i> |
| <i>Souche</i> WS2895 | | <i>Autres désignations</i> | | |

Conditions de croissance

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| <i>Temp.</i> 37 | <i>Milieu</i> BHI sang | <i>Aérobic/Anaérobic</i> | <i>Agitation</i> | <i>Autres</i> |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|

Lysogénie

Sensibilité phagique

HER 390 (φ3626)

Référence

Zimmer, M., S. Scherer, M.J. Loessner. 2002. Genomic analysis of *Clostridium perfringens* bacteriophage phi3626, which integrates into guaA and possibly affects sporulation. J. Bacteriol. 184: 4359-4368.

Remarque

Strongly hemolytic.

Also held in the following collections:
NTCC 3110, NCIB 3110, Cn 3792

Historique

Historique

Received from

Dr Martin Loessner, Insitut fur Mikrobiologie, FML
Weihenstephan, Technische Universitat Munchen,
Weihenstephan Berg 3, D-85350 Freising, Germany

Date

04-20-2002

Dernière mise à jour

2012-02-29